

Aus dem Hygienischen Institut der Universität Gießen. (Direktor: Professor Dr. Gotschlich.)

Ueber die desinfizierende Wirkung der Wachholderbeeren-Tinktur und ihre Wirksamkeit als Wundheilmittel.

INAUGURAL-DISSERTATION
ZUR ERLANGUNG DER VETERINÄR-MEDIZINISCHEN DOKTORWÜRDE
DER VETERINÄR-MEDIZINISCHEN FAKULTÄT
DER HESSISCHEN LUDWIGS-UNIVERSITÄT ZU GIESSEN.

VORGELEGT VON
KARL KURZ
PRAKT. TIERARZT AUS ALTENHAIN.

Referent:
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Olt.

Dem Andenken
meiner beiden auf dem Felde der Ehre
gefallenen Brüder gewidmet.

Ein die bei chirurgischen Eingriffen zu erstrebende und zu verlangende Asepsis begünstigendes neueres, gleichzeitig aber auch den Heilungsprozeß beförderndes Mittel ist das Mastisol, das von v. Oettingen zuerst angewandt wurde und so wegen seiner bequemen Anwendungsmöglichkeit bald allgemeiner Beliebtheit erfreute. Mastisol ist in der Hauptsache eine Lösung verschiedener Harze, besonders von Mastix, in Benzol.

v. Oettingen ging von dem Gedanken aus, daß die Infektion der Wunden vorwiegend von den Keimen herrühre, die in der Wunde und ihrer Umgebung sitzen. Durch die übliche mechanische Reinigung der Wunde selbst und der angrenzenden Hautpartien mit Wasser, Seife, Bürste und Spülungen werde die Infektion begünstigt. Durch diese Manipulationen gelangen die an den Wundrändern sitzenden Keime erst recht in die Wunde oder wuchern in die Wundfläche hinein. Die Verhütung einer Wundinfektion kann nur dann ermöglicht werden, wenn es gelingt, die Keime dort, wo sie sich gerade befinden, zu fassen, festzuhalten und unschädlich zu machen. Von diesem Gedanken ausgehend verwandte v. Oettingen als Fixierungsmittel für in der Umgebung von Wunden befindlichen Bakterien zuerst eine Auflösung von Mastix in Chloroform; er ersetzte aber später das Chloroform durch Benzol, da dieses leichter verdunstet. Die Klebekraft erhöhte er durch Zusatz einer geringen Menge eines Esters. Er nannte diese Harzlösung Mastisol. Es besitzt ein großes Penetrationsvermögen und dringt mit Leichtigkeit in alle Poren der Haut und Drüsenausführungsgänge ein, da auch Fette in ihm löslich sind. Nach Verdunsten des Lösungsmittels ist die Haut, sowie auch alle ihre Risse, Spalten und Vertiefungen mit einer dünnen Harzschicht überzogen bzw. gefüllt. Alle in ihnen sitzenden Keime sowie Staub- und Schmutzpartikel sind dadurch festgeleimt, verlieren ihre Beweglichkeit und sterben ab, da durch die Harzschicht weder Feuchtigkeit noch Luftsauerstoff, die sie ja zu ihrem Leben notwendig haben, zu ihnen gelangen kann. Die Wirkung des Mastisols beruht also auf einer Bakterienverklebung, Entwicklungshemmung und Bakterientötung.

Ein dem Mastisol ähnliches Mittel ist die Tinctura Juniperi Bacc., Wachholderbeeren-tinktur, die zuerst von dem russischen Magister med. vet. L. Iwanow während des Krieges hergestellt und angewandt wurde. Die Schwierigkeit der Beschaffung von Jod in für die Veterinärpraxis erforderlichen Mengen während des Krieges veranlaßte ihn, nach einem Ersatzmittel für die Jodtinktur zu suchen, die schließlich, auf den Versuchen v. Oettingens fußend, in der Wachholderbeeren-tinktur fand. Er ging dabei von dem Gedanken aus, daß die Wachholderbeeren reichlich aetherische Öle und Harze enthalten, die, auf extraktivem Wege gewonnen, eine dem v. Oettingen propagierten Mastisol ähnliche Wirkung entfalten müßten. Nach der Pharmakologie von Fröhner enthalten die Kerne der Wachholderbeeren 1–20% aetherische Öle, der Fruchthälter bis 300% Zucker, außerdem organische Säuren, Juniperin und Harz. Das Wachholderöl, welches durch Trockendestillation aus den Beeren gewonnen wird, stellt ein farbloses oder hellgelbes Öl dar, welches aus Terpenen ($C^{10} H^{16}$) und Sesquiterpenen ($C^{15} H^{24}$) besteht; es ist in Alkohol schwer löslich.

Die Herstellungsweise der Tinktur ist folgende: Die Beeren werden leicht in einem Mörser gestoßen. Darauf wird 1 Gewichtsteil dieser zerstoßenen Beeren mit 3 Teilen 90-95^o/oigem Spiritus vermengt und in einem verkorkten Gefäß 4 bis 7 Tage lang der Mazeration überlassen. Dieses so gewonnene Extrakt wird dann einer mehrmaligen Filtration durch Watte unterzogen. Man erhält so eine grünlich-braune, fast durchsichtige, aromatische, bittersüße, klebrige Flüssigkeit.

Iwanow wendete die Tinktur in folgender Weise an: Täglich wird die nächste Umgebung der Wunde (ungefähr 3-4 Finger breit von den Wundrändern) und darauf die Wundfläche selbst sorgfältig mit Hilfe von auf Holzstäbchen gewickelten Wattebäuschchen bestrichen. Die so aufgestrichene Tinktur trocknet schnell ein und interläßt einen leichten, zuerst glänzenden, aber sehr bald sich trübenden, harzigen Anflug. Bei offener Wundbehandlung darf das Haar um die Wunde herum nicht abgeschieden werden, da das lange Haar einen Schutz gegen Kälte im Winter, Hitze im Sommer und Feuchtigkeit bietet. Die Wunden und deren Umgebung werden unter keiner Bedingung vor dem Bestreichen mit der Tinktur mit Desinfizientien irrigiert, um einem Anfeuchten der die Wunde umgebenden Haare und einem Imbibieren des Gewebes mit Wasser (Oedembildung) zu entgehen. Auch werden die Wunden nicht mit adstringierenden Streupulvern bepudert, weil bei deren Wirkung eine Kompression der Blutgefäße hervorgerufen wird, infolgedessen Zirkulations- und Oxydationsstörungen an den Wundrändern, sowie im Granulationsgewebe, oft mit partieller Gewebsnekrose, beobachtet werden.

Am folgenden Tag wird die Wunde mit einem Wattebäuschchen abgewischt, ebenso auch die Wundränder. Bei dieser Manipulation bleiben die am Tage vorher durch die Tinktur und das Wundsekret eliminierten und unschädlich gewordenen Fremdkörper an dem Wattebäuschchen kleben und werden somit entfernt. Darauf wird die Wundfläche, als auch deren Umgebung wiederum mit der Tinktur leicht bestrichen. An den darauffolgenden Tagen wird besonders sorgfältig die Wundumgebung mit der Tinktur bestrichen, die Wundfläche selbst nur alle 2-3 Tage, um einen unnützen Reiz zu vermeiden. Iwanow hat in dieser Weise die Tinktur an Tausenden von Pferden bei verschiedenartigsten Wunden selbst angewandt und anwenden lassen und sah, wie er schreibt, seine gehegten Hoffnungen vollstens bestätigt. Er glaubt, daß außer Bildung einer harzigen Schutzschicht gegen Eindringen von Bakterien, eine günstige therapeutische Wirkung bei der Wundbehandlung mit der Tinctura Juniperi durch die ozonisierende Wirkung der in den Wachholderbeeren enthaltenen Terpene erzielt wird. Andererseits übt die Wachholderbeerentinktur einen weit geringeren Reiz auf das Gewebe aus als die Jodtinktur, welche oft partielle Nekrose hervorruft, wodurch eine Heilung verzögert wird. Weiterhin schreibt er dem in den Wachholderbeeren enthaltenen Zucker eine wichtige Rolle zu, und zwar der Kohlendensäurebildung bei der Gärung des Zuckers in der Wunde. Die Kohlendensäure müßte wohl die Entwicklung der in die Wunde geratenen aeroben Bakterien hemmen. Zugleich nimmt er an, daß die Kohlendensäure einen hormonartigen Reiz auf das Wachstum des Granulationsgewebes ausüben könnte. Ferner übe der in den Beeren enthaltene apfelsaure Kalk eine neutralisierende Wirkung auf die in der Wundgegend durch Zirkulationsstörung entstehenden Produkte der regressiven Metamorphose aus, wodurch eine Verminderung eines akuten Oedems an den Wundrändern erzielt wird.

Die Erfolge, die Iwanow mit der oben geschilderten Tinct. Junip. erzielt haben will, lassen bei der heutigen Arzneimittelnappheit und -teuerung und der Wohlfeilheit und den in unbegrenzter Menge im Inlande zu beschaffenden Wachholderbeeren eine Nachprüfung und die evtl. allgemein anzustrebende Verwendung der Tinct. Juniperi durchaus gerechtfertigt erscheinen.

Bakteriologische Untersuchungen.

Die Angaben über die Prüfungsergebnisse an den gleichen chemischen Desinfektionsmitteln sind in der Literatur sehr schwankend, je nach der Prüfungsmethodik der Untersucher. Sie sind deswegen auch nur schwer zu vergleichen und zu kontrollieren, weil die meisten Methoden der Untersuchungen an einer Anzahl von Fehlerquellen kranken, die freilich nicht leicht zu beseitigen sind. Von größtem Einfluß auf jeglichen Desinfektionsversuch ist z. B. der benutzte Nährboden, seine Herstellung und Zusammensetzung, weil von ihm die Resistenz der Testbakterien, wie auch die Resultate der Desinfektionsversuche selbst abhängig sind. Ferner sind die Resistenzschwankungen der einzelnen Testbakterien wohl zu berücksichtigen. Mehrere Forscher weisen darauf hin, daß selbst innerhalb eines und desselben Stammes Resistenzunterschiede vorkommen. Des weiteren ist bei vergleichenden Desinfektionsversuchen darauf zu achten, daß alle Lösungen in gleicher Weise hergestellt werden und dieselbe Temperatur aufweisen. Unterschiede von wenigen Grad bedingen oft schon bemerkenswerte Fehler im Resultate. Endlich ist der Unterschied zwischen Desinfektionswirkung und entwicklungshemmender Wirkung wohl zu berücksichtigen. Bei der Prüfung der Desinfektionswirkung chemischer Desinficientien ist die Hauptschwierigkeit die der Unschädlichmachung des Mittels nach beendigter Einwirkungszeit. Unmöglich ist es, dies durch bloßes Abspülen zu erreichen. Man hebt deshalb die Wirkung des Desinfektionsmittels durch ein für die Bakterien unschädliches Neutralisationsmittel auf. Bei einigen Desinficientien bleibt aber keine andere Wahl, da für diese kein unschädliches Neutralisationsmittel bekannt ist (z. B. Phenol und seine Abkömmlinge.)

Die Resultate der Versuche stellt man, nach beendigter Einwirkung und Unschädlichmachung des Desinficiens, durch Zählung der lebend gebliebenen Keime vermittels Aussaat auf Agarplatten und Beobachtung derselben unter Bruttemperatur während 2-3 Tage fest.

Meine Versuche stellte ich an mit einer nach der Iwanow'schen Vorschrift in der Hirsch-Apotheke zu Gießen unter genauer Kontrolle hergestellten Tinctur Juniperi unter Verwendung 90%igen Alkohols. Die so hergestellte Tinktur entsprach in Farbe, Geruch und Geschmack der von Iwanow beschriebenen. Sie ist in Wasser nicht klar löslich, bildet aber damit eine Emulsion. - Bei meinen Untersuchungen benutzte ich als Testbakterien folgende:

- I. *Bacillus enteritidis* Gärtner.
- II. *Staphylococcus pyogenes aureus*.
- III. *Streptococcus haemolyticus*.
- IV. *Bacillus* des Schweinerotlaufs.
- V. *Bacillus* der Schweineseuche.

Sämtliche Bakterienarten kamen bei den Versuchen in Reinkultur zur Anwendung, die zu den gleichen Versuchen verwandten Kulturen entstammten sämtlich derselben Mutterkultur und waren 24-48 Stunden alt.

A. Prüfung des entwicklungshemmenden Wertes.

Zur Prüfung des entwicklungshemmenden Wertes der Wachholderbeeren-Tinktur ging ich nach der gebräuchlichen, mir von Herrn Professor Dr. E. Gotschlich angegebenen Methode vor: Zu 2 ccm steriler Bouillon fügte ich Wachholderbeeren-Tinktur zu und zwar derart, daß ich Verdünnungen von 1 : 5, 1 : 10, 1 : 25, 1 : 50, 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500 und 1 : 1000 erhielt. Die Röhrchen beschickte ich dann mit einer kleinen Platinöse der Kulturen, und setzte sie 24 Stunden der Bruttemperatur aus. Darauf stellte ich fest, ob Trübung und damit Wachstum in den Röhrchen eingetreten war. Zur Kontrolle meiner Beobachtungen beimpfte ich Agarplatten mit der Lösung aus den beschickten Röhrchen, die ich dann auch wieder 24 Stunden lang der Bruttemperatur aussetzte. Den Parallelversuch dazu machte ich mit 90%igem Alkohol. Ein Bouillonröhrchen beschickte ich mit dem Testmaterial ohne Zusatz von Tinktur, um festzustellen, ob die Kulturen voll lebensfähig waren.

Die Ergebnisse meiner Versuche habe ich in untenstehenden Tabellen zusammengestellt. Es bedeutet:

- + = Trübung in den Bouillonröhrchen bzw. Wachstum auf den zur Kontrolle (K) beimpften Agarplatten.
- = Klarbleiben der Bouillon bzw. Sterilbleiben der Agarplatten.
- 0 = kein Zusatz von Tinktur.

I. Versuch.

Testbakterien : **Bac. ent. Gärtner.**

Nährböden : Nährbouillon und Agar-Agar.

Tabelle a.

	Verdünnung	Trübung der Bouillon	K
Tinct. Juniperi	0	+	+
	1 : 5	—	—
	1 : 10	—	—
	1 : 25	—	—
	1 : 50	—	—
	1 : 100	+	+
	1 : 200	+	+
	1 : 500	+	+
	1 : 1000	+	+
Alkohol 90%ig	1 : 5	—	—
	1 : 10	+	+
	1 : 25	+	+
	1 : 50	+	+
	1 : 100	+	+
	1 : 200	+	+
	1 : 500	+	+
	1 : 1000	+	+

II. Versuch.

Testbakterien: *Staphylococcus pyogenes aureus*.

Tabelle b.

	Verdünnung	Trübung der Bouillon	K
Tinct. Juniperi	0	+	+
	1 : 5	—	—
	1 : 10	—	—
	1 : 25	—	—
	1 : 50	—	—
	1 : 100	+	+
	1 : 200	+	+
	1 : 500	+	+
	1 : 1000	+	+
Alkohol 90%ig	1 : 5	—	—
	1 : 10	+	+
	1 : 25	+	+
	1 : 50	+	+
	1 : 100	+	+
	1 : 200	+	+
	1 : 500	+	+
	1 : 1000	+	+

III. Versuch.

Testbakterien: *Streptococcus haemolyticus*.

Tabelle c.

	Verdünnung	Trübung der Bouillon	K
Tinct. Juniperi	0	+	+
	1 : 5	—	—
	1 : 10	—	—
	1 : 25	—	—
	1 : 50	—	—
	1 : 100	+	+
	1 : 200	+	+
	1 : 500	+	+
	1 : 1000	+	+
Alkohol 90%ig	1 : 5	—	—
	1 : 10	—	—
	1 : 25	+	+
	1 : 50	+	+
	1 : 100	+	+
	1 : 200	+	+
	1 : 500	+	+
	1 : 1000	+	+

IV. Versuch.

Testbakterien: *Bacillus des Schweinerotla*.

Tabelle d.

	Verdünnung	Trübung der Bouillon	K
Tinct. Juniperi	0	+	+
	1 : 5	—	—
	1 : 10	—	—
	1 : 25	—	—
	1 : 50	+	+
	1 : 100	+	+
	1 : 200	+	+
	1 : 500	+	+
	1 : 1000	+	+
Alkohol 90%ig	1 : 5	—	—
	1 : 10	—	—
	1 : 25	+	+
	1 : 50	+	+
	1 : 100	+	+
	1 : 200	+	+
	1 : 500	+	+
	1 : 1000	+	+

V. Versuch.

Testbakterien: *Bacillus der Schweineseuc*.

Tabelle e.

	Verdünnung	Trübung der Bouillon	K
Tinct. Juniperi	0	+	+
	1 : 5	—	—
	1 : 10	—	—
	1 : 25	—	—
	1 : 50	+	+
	1 : 100	+	+
	1 : 200	+	+
	1 : 500	+	+
	1 : 1000	+	+
Alkohol 90%ig	1 : 5	—	—
	1 : 10	—	—
	1 : 25	+	+
	1 : 50	+	+
	1 : 100	+	+
	1 : 200	+	+
	1 : 500	+	+
	1 : 1000	+	+

- ergl. Tabelle a. Beim 1. Versuch, Bac. ent. Gärtner ergibt sich bis zu einer Verdünnung von 1 : 50 kein Wachstum der Kulturen. Bei noch stärkeren Verdünnungen wuchsen die Kulturen ungehemmt. Der gleichzeitig angestellte Versuch mit 90%igem Alkohol ergab nur bei 1 : 5 einen negativen Ausfall, bei allen anderen, stärkeren Verdünnungsgraden blieb das Bakterienwachstum unbeeinflusst.
- ergl. Tabelle b. Genau das gleiche Resultat zeigte sich bei der Ausprobierung unter Verwendung des Staphylococcus pyogenes aureus.
- ergl. Tabelle c. Der Streptococcus haemolyticus zeigte Entwicklungshemmung bei Zusatz von Tinct. Juniperi bis zu einer Verdünnung von 1 : 50, während er bei Alkoholzusatz schon bei einer Verdünnung von 1 : 25 wuchs.
- ergl. Tabelle d. Genau ebenso verhielt sich der Bacillus des Schweinerotlaufs.
- ergl. Tabelle e. Der Bacillus der Schweineseuche wächst erst bei Tinct. Juniperi 1 : 50, bei Alkohol zeigt er das gleiche Verhalten wie der Bacillus des Schweinerotlaufs.

Aus diesen Versuchen ergibt sich, daß die Tinctura Juniperi in stärkerer Konzentration entwicklungshemmend auf Bakterienwachstum wirkt. Ferner folgert aus den gleichzeitig angestellten Versuchen mit Alkohol, daß die Entwicklungshemmung nicht nur auf dem zur Herstellung der Tinktur benutzten 90%igen Alkohol beruht.

Von weiterer großer Wichtigkeit ist :

B. Die Prüfung des keimtötenden Wertes.

Auch hierbei ging ich nach der Anweisung des Herrn Professor Dr. E. Mutschlich vor. Ich wandte die Tinktur unverdünnt, in Verdünnung 1 : 50 und 1 : 100 an. In sterile Centrifugenröhrchen gab ich 2 ccm der Tinktur in den verschiedenen Verdünnungen und verrieb darin eine Platinöse Kultur. Ich ließ die Tinktur verschiedene Zeiten auf die Bakterien einwirken und zwar 5, 15 und 30 Minuten. Nach der Einwirkungszeit centrifugierte ich 5 Minuten lang. Nach Abgießen der Flüssigkeit vom Bodensatz fügte ich sterile physiologische Kochsalzlösung zu und centrifugierte. Dieses Auswaschen und Centrifugieren wurde ein zweites Mal wiederholt. Eine Platinöse des so erhaltenen Bodensatzes strich ich dann auf Agarplatten aus und setzte diese 48 Stunden der Bruttemperatur aus. Dann beobachtete ich, ob Wachstum eingetreten war. Meine angestellten Versuche habe ich in den unten stehenden Tabellen noch einmal zusammengefaßt.

In den Tabellen bedeuten :

- = Sterilbleiben der beimpften Agarplatten.
- +
- + = vereinzelt Kolonien.
- + + = mäßige Anzahl.
- + + + = sehr zahlreiche Kolonien.

VI. Versuch.

Testbakterien: **Bac. ent. Gärtner.**

Tabelle I.

	Verdünnung	Einwirkungsdauer in Minuten.		
		5	15	30
Tinct. Junip.	1 : 1	++	++	+
	1 : 10	+++	+++	++
	1 : 100	+++	+++	++

VII. Versuch.

Testbakterien: **Staphylococcus pyogenes aureus.**

Tabelle II.

	Verdünnung	Einwirkungsdauer in Minuten		
		5	15	30
Tinct. Junip.	1 : 1	++	+	+))
	1 : 10	+++	+++	++
	1 : 100	+++	+++	+++

*) nur 3 Kolonien.

VIII. Versuch.

Testbakterien: **Streptococcus haemolyticus.**

Tabelle III.

	Verdünnung	Einwirkungsdauer in Minuten.		
		5	15	30
Tinct. Junip.	1 : 1	+++	+++	—
	1 : 10	+++	+++	+++
	1 : 100	+++	+++	++

IX. Versuch.

Testbakterien: **Bacillus des Schweinerotlaufs.**

Tabelle IV.

	Verdünnung	Einwirkungsdauer in Minuten.		
		5	15	30
Tinct. Junip.	1 : 1	+++	+	—
	1 : 10	++	+	—
	1 : 100	+++	++	++

X. Versuch.

Testbakterien: **Bacillus der Schweineseuche.**

Tabelle-V.

	Verdünnung	Einwirkungsdauer in Minuten.		
		5	15	30
Tinkt. Junip.	1 : 1	+++	++	+
	1 : 10	+++	+++	++
	1 : 100	+++	+++	+++

- Vergl. Tabelle I. Bei den Versuchen ergab sich beim *Bacillus ent.* Gärtner bei Einwirkung des unverdünnten Mittels 5 und 15 Minuten lang eine mäßige Anzahl von Kolonien, bei 30 Minuten langer Dauer der Einwirkung bestanden nur noch ganz vereinzelter Kolonien. Bei Verdünnungen 1 : 10 und 1 : 100 zeigten sich bei 5 und 15 Minuten langer Einwirkung sehr zahlreiche Kolonien, die nach 30 Minuten abnahmen und spärlich wurden.
- Vergl. Tabelle II. Beim *Staphylococcus pyogenes aureus* wirkte die Tinktur 1 : 1 bei 5' Dauer mäßig abtötend, bei 15' zeigten sich vereinzelter, bei 30' nur 5 Kolonien. 1 : 10 und 1 : 100 hatten bis zu 30' Dauer keine Wirkung mehr: zahlreiche Kolonien.
- Vergl. Tabelle III. Der *Streptococcus haemolyticus*, der dem unverdünnten Mittel gegenüber bei 5 und 15 Minuten langer Einwirkung sich resistent verhielt, wurde bei 30' vollkommen abgetötet: keine Kolonien. In Verdünnungen wirkte Tinct. Junip. nicht ein.
- Vergl. Tabelle IV. Der *Bacillus des Schweinerotlaufs* verhielt sich wesentlich anders. Unverdünnte sowie 100/oige Einwirkung ergab bei 5' noch zahlreiche, bei 15' nur noch vereinzelter, bei 30' gar keine Kolonien mehr. Noch weitere verminderte Konzentration blieb auch bei 30 Minuten langer Einwirkung fast wirkungslos.
- Vergl. Tabelle V. Auf den *Bacillus der Schweineseuche* wirkte nur das unverdünnte Mittel bei 30 Minuten langer Dauer gering abtötend: vereinzelter Kolonien. Sonst war kein Erfolg zu bemerken.

Zusammenfassend kann ich mich dahin äußern, daß die officinelle Tinct. Junip. nur in unverdünntem Zustand oder in unvollständiger Weise bei Verdünnung von 1 : 10 und erst bei längerer Einwirkung einen gewissen bakterientötenden Einfluß hat; Wachstumshemmung kommt gleichfalls erst in Verdünnungen von 1 : 25 bis 1 : 50 zustande. Dabei ist noch zu bemerken, daß die Desinfektionswirkung wenigstens zum Teil auf der Alkoholbeimengung zum Extrakt beruht.

Therapeutische Versuche.

Von diesen Laboratoriumsversuchen ausgehend und auf ihnen fußend wandte ich die in der Hirschapotheke in Gießen nach meinen Angaben hergestellte Tinktur bei den verschiedensten Wunden bei Pferden, Rindern und Hunden an. Die Ergebnisse führe ich in den folgenden Krankheitsberichten näheren aus. Die Fälle wurden mir teils von Herrn Tierarzt Dr. Erb in Gießen überwiesen, teils stammen sie aus meiner eigenen Praxis.

- I. Fall. Fuchswallach, 9 Jahre. Kronentritt h. l. 5 cm lange, 1 cm breite Wunde. Bei der Besichtigung zeigt sich eine schmierig-eitrig belegte Wunde mit unregelmäßigen Rändern. Leichte Schwellung des umgebenden Gewebes. Die Wunde sezerniert reichliche Mengen eines grünlich-gelblichen Eiters. Bestreichen der Umgebung der Wunde (ca. 2-5 cm Umkreis) mit Tinct. Junip. Darauf wird die Wunde mit einem Wattebäuschchen ebenfalls mit Tinct. Junip. bestrichen. Dies wird täglich wiederholt. Die Umgebung wie Wunde sind nach 2-5 Minuten von einem glänzenden, klebrigen Häutchen überzogen. Nach 2 Tagen schon hat die Sezernierung nachgelassen, der schmierige Belag des Grundes ist verschwunden. Am 4. Tag ist der Ausfluß noch geringer, serös, die entzündliche Schwellung verschwunden, nach 8 Tagen hat die Wunde sich verkleinert, ist vollkommen trocken, nur mit etwas Schorf bedeckt. Nach 10 Tagen Wunde fast geschlossen, geringe Schorfbildung. Schmerzhaftigkeit auf Druck und Lahmen verschwunden; geheilt aus der Behandlung entlassen.
- II. Fall. Braunes Stutfohlen, Rißwunde auf der Kruppe, Stacheldrahtverletzung 15 cm lange, $\frac{1}{2}$ -1 cm breite, schmierig belegte Wunde mit zerfetzten unregelmäßigen Rändern. Behandlung wie oben. Am 2. Tage fast keine Änderung, am 3. Tage Ausfluß geringer, mehr serös. Am 5. Tage Wunde gereinigt, ganz geringe, seröse Sekretion, Wunde zieht sich zusammen. Am 7. Tage: Wunde beginnt sich von den Rändern her zu verkleinern und zu überhäuten, in der Mitte Schorfbildung. Nach 11 Tagen: Wunde reizlos, fast geschlossen; Patient wird aus der Behandlung entlassen.
- III. Fall. Deutsche Dogge, Hündin, $\frac{3}{4}$ Jahre. 5 cm lange Rißwunde an der Mamma. Unregelmäßig begrenzte, stark eiternde Wunde, schmerzhaft. Behandlung wie bei I.
 2. Tag: Abnahme der entzündlichen Röte und Schwellung der Umgebung. Ausfluß eher etwas stärker geworden, schmierig-eitrig.
 3. Tag: Sekretion etwas geringer, wird klarer.
 4. Tag: Ausfluß serös, Schwellung in der Umgebung der Wunde ist bis auf geringe Reste verschwunden.
 6. Tag: Wunde hat sich gereinigt, geringfügiger, seröser Ausfluß.
 9. Tag: Wunde trocken, mit Schorf bedeckt, verkleinert sich.
 12. Tag: Wunde bis auf $\frac{1}{2}$ cm Schorf geschlossen; geheilt entlassen.
- IV. Fall. Kuh, schwarzbunt, 5 Jahre. Rißwunde am Triel, durch Stoß entstanden. Frische, 12 cm lange, $1\frac{1}{2}$ cm breite Wunde mit gezackten Rändern. Behandlung wie oben. Als erster Erfolg zeigt sich keine Eiterung, sondern nur ganz geringfügiger, seröser Ausfluß. Die Wunde beginnt schon bald fortgesetzter täglicher Behandlung vom 5. Tage an sich mit leichter Schorf zu bedecken und ist am 10. Tage vollkommen abgeheilt; geheilt aus der Behandlung gegeben.

- Fall. Braune Stute, 10 Jahre. Fünfmarkstück große, unregelmäßig begrenzte, frische, durch Straßenschmutz verunreinigte Wunde (durch Sturz entstanden) an der rechten Vorderfußwurzel. Behandlung wie oben.
2. Tag: Leicht entzündliche Schwellung der Umgebung, grünlich-eitriger Belag in der Tiefe, geringe Sezernierung eines dünnflüssigen Eiters.
3. Tag: Grund noch belegt, Ausfluß geringer.
5. Tag: Wunde gereinigt, keine Schwellung mehr, Ausfluß serös.
8. Tag: Schorfbildung, vom Rande her Ueberhäutung.
12. Tag: Wunde bis auf Pfennigstück großen Schorf in der Mitte geschlossen: geheilt entlassen.
- Fall. Fuchswallach, 8 Jahre. Nagelrißwunde in der Gegend des Schultergelenks; stark eiternde, in der Umgebung entzündlich geschwollene, 7 cm lange, unregelmäßige Wunde. Behandlung wie oben.
Nach 5 Tagen wird der Ausfluß mehr serös, Schwellung schwindet.
Am 11. Tage ist die Wunde verkleinert und mit Schorf bedeckt.
Wird, da zur Arbeit nötig, als in Heilung begriffen, aus der Behandlung entlassen.
- I. Fall. Rappwallach, 12 Jahre. Fistulöse Wunde rechte Schulter. Patient ist seit 14 Tagen in Behandlung, bisher Anwendung von Jodtinktur. Der Fistelkanal ist bleistiftstark, ungefähr 5 cm tief und entleert auf Druck mäßige Mengen von Eiter. Behandlung wie oben, nur diesmal Einspritzungen von Tinct. Junip. in den Fistelkanal.
2. Tag: Keine Aenderung des Befundes. Wiederholung der Einspritzung.
3. Tag: Sezernierung vielleicht etwas geringer.
5. Tag: Nachlassen des Ausflusses, der mehr serös geworden ist.
7. Tag: Ausfluß hat bedeutend nachgelassen, Sondierung des Kanals ergibt eine Verkürzung auf 4 cm.
9. Tag: Geringer, seröser Ausfluß, Kanal im unteren Ende enger.
11. Tag: Ganz geringfügige, seröse Sekretion, Fistelkanal mäßig verengert, noch 3 cm tief. Patient wird, da unbedingt gebraucht, als in Heilung begriffen, aus der Behandlung gegeben.
- II. Fall. Brauner Wallach, 14 Jahre. Kleine 2½ cm lange Wunde, durch Riß an der Futterraufe entstanden, am rechten Augenbogen. Frische Wunde, die nach 5tägiger Behandlung vollkommen abgeheilt ist.
- Fall. Rotschimmel Stute, 6 Jahre. Rißwunde r. Flanke, durch Geschirrhaken, 10 cm lang, 1 cm breit, zackige Ränder. Grund schmierig belegt. Umgebung leicht geschwollen. Behandlung wie oben.
Nach 5 Tagen ist der Grund der Wunde gereinigt und es besteht nur noch geringer seröser Ausfluß.
Am 7. Tage schon Schorfbildung.
Am 12. Tage: Wunde geschlossen, geheilt entlassen.
- Fall. Dackelhündin, Rißwunde rechte Vorderpfote, 2 cm lang, zackig gerändert. Frische Wunde, Patient wird bald nach der Verletzung zu mir gebracht. Behandlung wie oben. Verband. Nach 3 Tagen ist keine Eiterung eingetreten, geringer seröser Ausfluß.
Nach 5 Tagen ist auch dieser verschwunden.
Am 8. Tage sind die Wundränder verklebt und mit Schorf bedeckt; als in Heilung begriffen aus der Behandlung gegeben.

Zusammenfassung.

Die oben von mir angeführten Fälle mit ihrem teilweise überraschenden und schnellen Heilungsverlauf bestätigen voll und ganz die von Iwanow gegebenen Erfolge, übertreffen in ihrer praktischen Wirksamkeit die im Laboratoriumsversuch sich ergebenden Resultate. Von besonderer Bedeutung ist dabei die ungünstige Wirkung der Tinct. Junip. bei frischen Wunden. Dabei wurde nicht eine Infektion verhütet, sondern die primäre Heilung (ad primam intensionem) überaus begünstigt. Bei den Kranken, die mit schon infizierten Wunden in meine Behandlung kamen, wirkte die Wachholderbeerentinktur zwar nicht so schnell bei frischen Wunden, aber die bakterientötende und entwicklungshemmende Kraft zeigte sich doch sehr bald in der Reinigung der Wunde, dem Nachlassen und dem Seröswerden des vorher eitrigen Ausflusses. Von ebenso großer Bedeutung ist das Fehlen von irgendwelchen Reizwirkungen auf die Wunde selbst oder deren Umgebung. Ich habe im Gegenteil in allen von mir behandelten Fällen immer ein Nachlassen der entzündlichen Erscheinungen, nie eine reaktive Reizwirkung bemerkt. Die guten Resultate zusammen mit der Billigkeit der in unbegrenzter Menge im Inland zu beschaffenden und leicht herstellbaren Wachholderbeerentinktur lassen eine ausgedehnte Verbreitung und weitere Ausprobierung dieses meiner Ansicht nach ausgezeichneten Mittels angezeigt erscheinen. Ich empfehle den Gebrauch der Tinct. Junip. bei allen frischen und eiternden Wunden und wende es genau nach der Iwanow'schen Methode an. Meiner Ansicht nach verdient die Tinct. Junip. der Tierheilkunde große Beachtung und wird sie infolge ihrer bequemen Anwendungsmöglichkeit schnell Eingang finden.

Zum Schlusse darf ich nicht verfehlen, Herrn Prof. Dr. E. Gotschlich die freundliche Ueberweisung des Themas und die lebenswürdige Unterstützung bei meinen Versuchen meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Herrn Tierarzt Dr. Erb in Gießen danke ich ebenfalls für die entgegenkommende Zuwendung von Material.

Literatur.

1. L. Iwanow: Wachholderbeerentinktur bei der Wundheilung. *Bayerische tierärztliche Wochenschrift* 1918 No. 40, S. 391.
2. E. Merck's Jahresbericht XXXI. und XXXII. Jahrgang S. 504. „Tinct. Junip. Bacc.“
3. Kolle-Wassermann Bd. III: E. Gotschlich: Desinfektionslehre.
4. C. Flügge: Grundriß der Hygiene.
5. *Zeitschrift für Veterinärkunde* XXVI Jahrgang 1914. S. 457.
6. P. Jordanoff: Untersuchungen über die Wundbehandlung mit Maschenlösungen in der Veterinärchirurgie. Inaug. Diss. Hannover.

Lebenslauf.

Ich, Karl Hermann Kurz, bin geboren am 1. März 1896 zu Altenhain (Kr. Schotten) als Sohn des Lehrers Fr. Kurz. Von Ostern 1902 bis Ostern 1905 besuchte ich die Volksschule zu Meiches (Kr. Schotten). Darauf trat ich in die Realrealschule zu Alsfeld ein, die ich im Februar 1914 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Zur Militär-Veterinärlaufbahn angenommen, wurde ich am 1. April 1914 als einjährig-freiwilliger Veterinäraspirant bei dem Feldartillerie-Regiment No. 47 eingestellt, mit dem ich auch bei Mobilmachung ins Feld rückte. Durch kriegsministerielle Verfügung aus dem Heeresdienst entlassen, begann ich im Sommer-Semester 1916 mein Studium an der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin als Angehöriger der Militär-Veterinär-Akademie. Hier bestand ich im Mai 1918 das tierärztliche Vor-examen und ging im August 1918 als Feldunterveterinär wieder ins Feld. Nach der Demobilmachung setzte ich mein Studium an der Berliner Hochschule fort; hier bestand ich am 8. Januar 1920 die tierärztliche Fachprüfung. Ende Januar 1920 ließ ich mich in Alsfeld (Hessen) als prakt. Tierarzt nieder. Die erste Hälfte des Winter-Semesters 1920/21 widmete ich der Ausarbeitung vorliegender Dissertation.

